



**LABM DROUOT**

21, rue Drouot - 75009

PARIS

Tel : 01 45 23 10 45

Fax : 01 47 70 77 79

Autorisé sous le N° 75 287

## SCOTCH TEST

### Intérêt :

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et troubles du sommeil.

### Préconisations pour le prélèvement :

A effectuer au lever avant la toilette et les premières selles.

- Utiliser du scotch transparent que vous décollerez de son support
- Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support.
- Renouveler l'opération avec le second scotch.
- Replacer les 2 lames dans l'étui.
- Identifier l'étui avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.

L'étui doit être acheminé au laboratoire dans les **plus brefs délais** (maximum 2h après la fin du recueil)



**LABM DROUOT**

21, rue Drouot - 75009

PARIS

Tel : 01 45 23 10 45

Fax : 01 47 70 77 79

Autorisé sous le N° 75 287

## SCOTCH TEST

### Intérêt :

Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et troubles du sommeil.

### Préconisations pour le prélèvement :

A effectuer au lever avant la toilette et les premières selles.

- Utiliser du scotch transparent que vous décollerez de son support
- Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support.
- Renouveler l'opération avec le second scotch.
- Replacer les 2 lames dans l'étui.
- Identifier l'étui avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.

L'étui doit être acheminé au laboratoire dans les **plus brefs délais** (maximum 2h après la fin du recueil)